



**¡VOLCADOS CON LA SEGURIDAD DEL
PACIENTE!**



**RECORDATORIO DE SEGURIDAD DE LOS
ENVASES ABIERTOS**

**BOLETIN DE SEGURIDAD
Nº 1 2022**



**Hospital Universitario
Infanta Cristina**



RECORDATORIO DE SEGURIDAD DE CADUCIDADES CON ENVASE ABIERTO

Anotar la fecha de apertura en un lugar visible

Antisépticos ¿Cuándo desecharlos?

Clorhexidina solución acuosa



0,5%

2 meses

desde su apertura



2%

3 meses

desde su apertura

Clorhexidina alcohólica



2%

6 meses

desde su apertura

Alcohol 70°

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Menalcol reforzado 70°

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Povidona yodada

(Solución cutánea, solución jabonosa y/o gel)



Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Agua oxigenada

A partir de los 2 meses va perdiendo sus propiedades



Antipsicóticos ¿Cuándo desecharlos?

Risperdal

(Solución oral)



3 meses

desde su apertura



Haloperidol

(Gotas orales)

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Otros

¿Cuándo desecharlos?



Primperan

(Solución oral)

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Insulina

(Viales o plumas abiertos)

28 días (máximo)
sin refrigeración



Mantener los no abiertos refrigerados

Lactulosa

(Solución oral)

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Romilar

(Jarabe)

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Lanacordin

(Solución oral)

Utilizable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.